

mobilomed msept Skinsoft

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel

- 2-Propanol 70% (V/V) Lösung
- Parfümfrei
- Begrenzt viruzid inkl. HBV, HIV, HCV, bakterizid, levurozid, tuberkulozid
- Für sensible Haut empfohlen



Alkoholisches, parfümfreies Desinfektionsmittel zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion ohne Rückfetter.

Gebrauchsinformation

STOFF- und INDIKATIONSGRUPPE

Desinfektionsmittel

ART DER ANWENDUNG

Zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen

ANWENDUNGSGEBIETE

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühlumschläge

ANWENDUNG

Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten.

Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und 5 Minuten* lang feucht gehalten. Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden lang feucht gehalten.

Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 1 Minute lang feucht gehalten.

Zur Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 10 Minuten lang feucht gehalten.

Für Kühlumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden.

*Gem. VAH wurde eine Einwirkzeit von 1,5 Minuten bestätigt.

Hinweise

Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z. B. feuchte Haut, Verschmutzungen der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. mobilomed Skinsoft wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet.

GEGENANZEIGEN

Skinsoft ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

WECHSELWIRKUNGEN

Mit anderen Arzneimitteln: keine bekannt

NEBENWIRKUNGEN

Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

MELDUNGEN VON NEBENWIRKUNGEN

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht hier angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn (www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

ZUSAMMENSETZUNG

100 g Lösung enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: 63,1 g 2-Propanol

Sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser

WARNHINWEISE

Leicht entzündlich! Von Zündquellen fern halten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

WIRKSPEKTREN UND EINWIRKZEITEN

(Gebrauchsfertige Lösung! Nicht verdünnen!)

hygienische Händedesinfektion gem. VAH EN1500	30 sek
chirurgische Händedesinfektion gem. VAH EN12791	1,5 min*
chirurgische Händedesinfektion gem. AMG	5 min
Hautdesinfektion vor Injektionen, Punktionen peripherer Gefäß	15 sek
Hautdesinfektion vor Operationen, Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen, Hohlorganen an talgdrüsenarmer Ha	1 Min
Desinfektion an talgdrüsenreicher Ha	3 Min
Mykobakterizid (M. terrae und M. avium)	30 sek
wirksam gegen alle behüllten Viren inkl. HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV/Grippe-/Influenza-Viren (begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung)	15 sek

LIEFERFORMEN

Artikelnummer	Inhalt	Flasche	VPE
137114	150ml	Kittelflasche	20 x 100ml
116262	500ml	Flasche	20 x 500ml
116263	1 Liter	Euroflasche	12 x 1L
116264	5 Liter	Kanister	3 x 5L

Hersteller/pharmazeutischer Unternehmer
Heck Hygiene GmbH
Ostring 1
34277 Fuldabrück
Vertrieb durch die mobiloclean Handelsgruppe

GUTACHTEN UND ZERTIFIKATE

Dr. med. Pitten, Hygieniker, Gießen:
Gutachten zur hygienischen und
chirurgischen Händedesinfektion nach
VAH/DGHM Richtlinien

Prof. Dr. med. Schubert, Hygieniker, Frankfurt/Main:
Gutachten zur hygienischen und chirurgischen
Händedesinfektion nach VAH/DGHM Richtlinien.

Dr. Steinmann, Virologe, Bremen:
Gutachten zur BVDV-Wirksamkeit (HCV) gem. RKI/DVV Leitlinie
2008.
Gutachten zur Vacciniavirus-Wirksamkeit gem. RKI/DVV Leitlinie
2008.
Wirksamkeitsbestätigung gegen H1N1/H5N1-Viren.

Zulassung und Listungen:
Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH.
Eingetragen in die Desinfektionsmittelliste des RKI gem. §18 IfSG. Gelistet in der IHO-
Viruzidie-Liste (www.iho-viruzidie-liste.de).
Zugelassen nach dem AMG in Deutschland. Zul.-Nr.: 1599.98.99

DATEN ZUR UMWELT

Alle Behälter und Verschlüsse bestehen aus Polyethylen (HDPE).
Die Behälter und Verschlüsse sind entsprechend gekennzeichnet, um eine sortenreine Trennung und eine optimale
Wiederverwertbarkeit zu ermöglichen.

**Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen**

Stand der Informationen 05/2021